

1. **In un paziente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene:**

- a) Con le sole pacche interscapolari
- b) Con la sola manovra di Heimlich
- c) Incentivando la persona a tossire e controllandola
- d) Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich

2

2. **L'indice di massa corporea, BMI, si misura :**

- a) Peso (kg) /altezza al quadrato, (m<sup>2</sup>)
- b) Altezza al quadrato (m<sup>2</sup>) /peso ( kg)
- c) Peso al quadrato( kg<sup>2</sup>)/ altezza (m)
- d) Peso (kg) per latezza (m) / altezza al quadrato

3. **Un infermiere osserva che il suo collega smaltisce una sacca di soluzione infusioneale, deflussore e agocannula appena rimossi da un residente come "rifiuti sanitari assimilati a rifiuti urbani" l'infermiere ne deduce che il collega ha smaltito i rifiuti:**

- a) Non in modo corretto: deflussore e agocannula smaltiti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- b) In modo corretto
- c) Non in modo corretto: agocannula smaltiti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- d) Non in modo corretto: agocannula smaltito nei rifiuti con modalità specifiche di smaltimento

4. **L'anosognosia in un paziente con ictus interferisce con il recupero in fase post-caduta perché il paziente:**

- a) E' facilmente affaticabile
- b) Non è in grado di comunicare
- c) Non è in grado di comprendere ciò che gli viene richiesto
- d) Non è consapevole della menomazione

5. **Tutte le seguenti affermazioni riguardanti la malattia di Alzheimer sono vere, tranne:**

- a) La maggior parte dei casi sono familiari
- b) L'attività corticale cerebrale della colin-acetiltransferasi è ridotta
- c) I sintomi iniziali spesso simulano la depressione
- d) Non vi sono specifiche indagini di laboratorio patologiche

**6. L'informazione e il consenso quale principio etico rispettano?**

- a) Principio di giustizia
- b) Principio di autonomia
- c) Principio di beneficenza
- d) Principio di non maleficenza

**7. Secondo le più recenti raccomandazioni nelle linee guida per la cura della cute, quale di queste manovre un tempo considerata utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa?**

- a) Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica.
- b) Ridurre l'esposizione della cute a umidità causata da incontinenza, sudorazione, o secrezioni delle ferite.
- c) Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee.
- d) Idratare la pelle con prodotti idratanti.

**8. Quale delle seguenti è la causa più frequente di embolia polmonare?**

- a) Trombosi venosa superficiale arti inferiori
- b) Trombosi dell'arto dx
- c) Trombosi profonda arti inferiore
- d) Endocardite batterica

**9. Che cosa s'intende per epidemia?**

- a) La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un'area limitata e in breve periodo di tempo
- b) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi in un certo territorio
- c) La comparsa di un numero elevato di una malattia in un breve periodo di tempo in un territorio molto ampio
- d) Nessuna delle precedenti è corretta

**10. Il dolore neuropatico può essere?**

- a) Urente
- b) Associato a formicolio
- c) Cronico-parossistico
- d) Tutte

**11. Qual è il parametro più semplice e più fedele per misurare in un residente edematoso le variazioni della ritenzione idrica?**

- a) L'ematocrito
- b) La diuresi
- c) Il peso delle feci
- d) Il peso corporeo

**12. La diarrea infiammatoria nelle persone anziane è più frequentemente causata da:**

- a) Shigella
- b) Salmonella
- c) Clostridium difficile
- d) Staphylococco aureus

**13. Durante la somministrazione di una sacca di concentrato eritrocitario un residente manifesta brivido, febbre, rush cutaneo e dispnea. Quali sono gli interventi da mettere in atto?**

- a) Rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se confermata la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- b) Interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare la sacca ed il set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- c) Avvisare il medico, rallentare la somministrazione, impostare terapia cortisonica, inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
- d) Interrompere la somministrazione, avvisare il medico, rimuovere l'accesso venoso ed applicare ghiaccio sulla sede di iniezione, inviare la sacca al centro trasfusionale.

**14. I neurolettici long acting, detti anche depot, sono preparati particolari che permettono in un'unica somministrazione la copertura terapeutica protratta per:**

- a) 20-30 gg
- b) 8-10 gg
- c) 30-40 gg
- d) 10-15 gg

**15. Per disartria si intende:**

- a) Incapacità di articolare in modo adeguato le parole per una lesione del S.N.C. o S.N.P.
- b) Una alterazione della comprensione del linguaggio
- c) Un movimento anomalo involontario
- d) Tutte le precedenti

**16. Nella tecnica di iniezione intramuscolare, è indicato:**

- a) Evitare il massaggio in quanto può favorire la dispersione del farmaco
- b) Favorire il massaggio per agevolare l'assorbimento del farmaco
- c) Iniettare rapidamente con una velocità di 50 secondi/ml
- d) Favorire il massaggio per potenziare il principio attivo del farmaco

**17. Quale di questi non è un effetto degli analgesici stupefacenti?**

- a) Miosi
- b) Ipotensione
- c) Riduzione della diuresi
- d) Aumento dell'ampiezza e della frequenza del respiro

**18. La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:**

- a) Dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali
- b) Ostruzione cronica parzialmente reversibile delle vie aeree
- c) Febbre, tosse secca, dimagrimento
- d) Tutte le precedenti alternative sono corrette

**2^ DOMANDE APERTE**

- 1) Descrivere gli interventi in un residente con sospetta frattura di femore.
- 2) Quali sono i possibili interventi da attuare nella gestione di un residente affetto da demenza con wondering.
- 3) Assistere il residente durante la fase terminale della vita. Parli degli aspetti etici legati alla professione infermieristica, approccio con la persona e familiari.