



## TEMA N. 2

1. Durante la somministrazione di una sacca di concentrato eritrocitario un residente manifesta brivido, febbre, rush cutaneo e dispnea. Quali sono gli interventi da mettere in atto?

- Rallentare la somministrazione, avvisare il medico, se confermata la reazione sospendere la somministrazione e inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- Interrompere la somministrazione, mantenere la via venosa, avvisare il medico, conservare la sacca ed il set, prelevare un campione di sangue, attivare il servizio trasfusionale per gli accertamenti.
- Avvisare il medico, rallentare la somministrazione, impostare terapia cortisonica, inviare la sacca al servizio trasfusionale per gli accertamenti
- Interrompere la somministrazione, avvisare il medico, rimuovere l'accesso venoso ed applicare ghiaccio sulla sede di iniezione, inviare la sacca al centro trasfusionale.

2. Un residente affetto da scompenso cardiaco è in terapia con furosemide, digossina e potassio canreonato. Il residente appare confuso e riferisce nausea, alterazioni del visus, cefalea ed astenia. Il tracciato ECG mostra blocco atrio-ventricolare di primo grado. L'infermiere a quale situazione clinica ricondurrà tali dati?

- Intossicazione digitalica
- Iperpotassiemia
- Disidratazione
- Edema polmonare

3. Un residente affetto da demenza di livello moderato ha difficoltà a bere e tossisce all'assunzione dei liquidi. Quali indicazioni darà l'infermiere?

- Capo rivolto all'indietro, addensare i liquidi preferiti, utilizzare bicchiere adatto riempito in minima parte
- Capo rivolto in avanti, preferire spremute o succhi di frutta concentrati, può utilizzare una cannuccia
- Capo rivolto in avanti, addensare liquidi preferiti, utilizzare un bicchiere adatto riempito almeno tre quarti
- Capo eretto e allineato, utilizzare uno schizzettone da posizionare a lato della bocca somministrando piccole quantità di liquido

4. A quali categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine

- Diuretici
- Miocardiotonici
- Sedativi
- Antiarritmici

5. In un residente con ostruzione parziale delle vie aeree si interviene:

- Con le sole pacche interscapolari
- Con la sola manovra di Heimlich
- Incentivando la persona a tossire controllandola
- Accoppiando pacche interscapolari alle manovre di Heimlich

6. Le fiale di Sodio Bicarbonato da 10 ml hanno la seguente concentrazione: 1mEq/ml. Definire il numero di fiale necessarie per somministrare 25mEq
- $\frac{1}{2}$
  - 1+1/2
  - 2
  - 2+1/2
7. Nella demenza di Alzheimer i deficit cognitivi sono dovuti a:
- Ipotiroidismo
  - Carenze vitaminiche
  - Ipercalcemia
  - Nessuno
8. Sono sintomi ostruttivi di ipertrofia prostatica benigna tutti, tranne:
- difficoltà nell'iniziare la minzione
  - riduzione della forza del flusso urinario
  - incontinenza da urgenza
  - ritenzione urinaria
9. Quale tra le seguenti non è una caratteristica dei contenitori per lo smaltimento di aghi e taglienti ?
- essere a tenuta stagna
  - essere resistenti agli urti
  - avere un sistema di chiusura irreversibile
  - essere almeno in parte trasparenti
10. Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?
- Maschera semplice
  - Cannula
  - Maschera Venturi
  - Maschera con serbatoio
11. Su quali parametri si basa la valutazione dell'indice di Norton?
- Condizioni generali, stato mentale, deambulazione, mobilità, incontinenza
  - Condizioni generali, nutrizione, mobilità, incontinenza, percezione sensoriale
  - Stato mentale, deambulazione, nutrizione, incontinenza
  - Stato mentale, percezione sensoriale, nutrizione, attività
12. Secondo la commissione nazionale per la formazione continua, il termine "credito formativo" definisce:
- Una misura del tempo dedicato annualmente all'aggiornamento
  - Un programma di autoformazione a distanza
  - Un attestato che si riceve dopo la partecipazione ad evento formativo
  - Una capacità didattica acquisita dopo uno specifico corso



13. Un infermiere osserva che il suo collega smaltisce una sacca infusione, deflussore e agocannula appena rimossi da un residente come "rifiuto sanitario assimilabili a rifiuti urbani" l'infermiere ne deduce che il collega ha smaltito i rifiuti:

- a) Non in modo corretto: deflussore e agocannula smaltiti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- b) In modo corretto
- c) Non in modo corretto: agocannula smaltiti nei rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- d) Non in modo corretto: agocannula smaltito nei rifiuti con modalità specifiche di smaltimento

14. Qual'è di questi un effetto degli analgesici stupefacenti?

- a) Miosi
- b) Ipotensione
- c) Riduzione della diuresi
- d) Aumento dell'ampiezza e della frequenza del respiro

15. Il rischio che cos'è?

- a) La conseguenza di un evento pericoloso
- b) La probabilità intrinseca di un determinato fattore o oggetto di causare un danno durante il suo utilizzo
- c) La probabilità di subire un danno in conseguenza dell'esposizione ad una situazione pericolosa che è considerata tale per la presenza di una o più fonti di pericolo
- d) La scelta cosciente di esporsi ad una condizione di pericolo

16. Cosa si intende per "data breach"?

- a) la raccolta del dato riferito al credo religioso
- b) un accesso abusivo al sistema informatico compiuto da parte di un hacker
- c) un episodio che compromette la sicurezza del dato personale
- d) la conservazione sostitutiva della documentazione in modalità elettronica

17. In che tipologia di rifiuti rientra un pannolone con tracce ematiche?

- a) rifiuti speciali
- b) rifiuti potenzialmente infettivi
- c) rifiuti ospedalieri
- d) rifiuti assimilabili agli urbani

18. Quali misure di sicurezza possono ritenersi adeguate?

- a) quelle in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
- b) quelle stabilite dal disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. 196/03
- c) quelle adottate dall'incaricato in ragione della propria valutazione del rischio
- d) quelle stabilite dall'amministratore di sistema in ambito di sicurezza informatica

RK





